



# COMIENZO DE SU **RECORRIDO** con **BOSULIF**<sup>®</sup> (bosutinib)

## GUÍA DEL TRATAMIENTO PARA ADULTOS

### INDICACIONES

BOSULIF es un medicamento de venta con receta que se utiliza para tratar a las siguientes personas:

- adultos que tienen un tipo determinado de leucemia llamada leucemia mielógena crónica con cromosoma Filadelfia (LMC Ph+) en fase crónica (FC) con diagnóstico reciente o que ya no se beneficien de otro tratamiento o que no lo hayan tolerado;
- adultos con LMC Ph+ en fase acelerada (FA) o en fase blástica (FB) que ya no pueden beneficiarse de otro tratamiento o no lo hayan tolerado.

Consulte un resumen breve de **DATOS IMPORTANTES** sobre **BOSULIF** en las páginas 4 y 5. [HAGA CLIC AQUÍ](#) para acceder a la ficha técnica completa, en la que se incluyen las instrucciones de uso.



**Bosulif**<sup>®</sup>

bosutinib

tablets 500 mg | 400 mg | 100 mg  
capsules 100 mg | 50 mg

## GUÍA PARA ADULTOS SOBRE EL TRATAMIENTO CON BOSULIF® (BOSUTINIB)

Al iniciar un tratamiento nuevo, pueden surgir muchas preguntas. En este folleto, encontrará información sobre muchos temas que podrían ayudarlo con lo siguiente:

- comprender la LMC;
- regular el tratamiento y los efectos secundarios;
- encontrar recursos y apoyo.

En este folleto, verá que algunos términos **están subrayados**; para conocer su significado, consulte la sección “Términos que debe conocer”.

## ¿QUÉ ES LA LMC?

**LMC significa leucemia mielógena crónica. Es un tipo de cáncer de la sangre y de la médula ósea.**

Cuando una persona tiene LMC, crecen glóbulos blancos irregulares de manera incontrolable en la médula ósea y se acumulan en la sangre. Estas células se llaman células leucémicas. Con el tiempo, las células leucémicas desplazan a los glóbulos blancos, a los glóbulos rojos y a las plaquetas en buen estado.

## ¿QUÉ CAUSA LA LMC?

Un cromosoma anómalo, llamado el **cromosoma Filadelfia (Ph)**, puede causar la LMC. Si la causa de la LMC es este cromosoma, también se puede denominar LMC Ph+. Este cromosoma anómalo produce una proteína anómala llamada **BCR-ABL**. La BCR-ABL hace que las células leucémicas crezcan y se dividan sin control.

## ¿CÓMO SE TRATA LA LMC?

Los medicamentos llamados **inhibidores de las tirosina cinasas (tyrosine kinase inhibitors, TKI)** pueden bloquear la actividad de la BCR-ABL, lo que ralentiza el crecimiento de los glóbulos blancos anómalos. Esta ralentización permite en algunos pacientes que los glóbulos blancos vuelvan a los niveles normales.

## ¿POR QUÉ TOMO BOSULIF?

BOSULIF es un tratamiento que usan las siguientes personas:

- **PACIENTES ADULTOS CON DIAGNÓSTICO RECIENTE DE LMC PH+ EN FASE CRÓNICA**

Esto significa que recibe tratamiento por primera vez.

- **PACIENTES ADULTOS CON LMC Ph+ EN FASE CRÓNICA, ACELERADA O BLÁSTICA QUE PRESENTARON RESISTENCIA O INTOLERANCIA A TRATAMIENTOS PREVIOS**

Esto significa que el medicamento que le indicaron ya no funciona para controlar la LMC o que ya no puede tomar el medicamento que toma actualmente debido a efectos secundarios incontrolables.

No tome BOSULIF si es alérgico al bosutinib o a cualquiera de los componentes de BOSULIF. Se desconoce si BOSULIF es seguro y eficaz en menores de 1 año con LMC Ph+ en FC con diagnóstico reciente o que ya no se benefician de otro tratamiento o no lo toleraron, o en niños con LMC Ph+ en FA o con LMC Ph+ en FB.

**INFORME A TODOS LOS PROFESIONALES DE LA SALUD QUE LO ATIENDEN QUE ESTÁ TOMANDO BOSULIF**

## TÉRMINOS QUE DEBE CONOCER

**BCR-ABL:** una proteína anómala que hace que la médula ósea produzca células leucémicas.

**Médula ósea:** el tejido blando, similar a una esponja, que está en el centro de la mayoría de los huesos. Produce glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas.

**Inhibidores de las tirosina cinasas (TKI):** en la LMC, un TKI se usa para bloquear la actividad de la proteína BCR-ABL (una tirosina cinasa); el TKI ralentiza el crecimiento de las células leucémicas.

**Cromosoma Filadelfia (Ph):** una anomalía en el cromosoma que provoca la producción de la proteína BCR-ABL. Esta proteína hace que las células leucémicas crezcan de manera incontrolable.

Consulte un resumen breve de **DATOS IMPORTANTES** sobre BOSULIF en las páginas 4 y 5. **HAGA CLIC AQUÍ** para acceder a la ficha técnica completa, en la que se incluyen las instrucciones de uso.

## BOSULIF PUEDE CAUSAR EFECTOS SECUNDARIOS GRAVES, POR EJEMPLO:

- **Problemas estomacales.** BOSULIF puede causar dolor de estómago (abdomen), náuseas, diarrea, vómitos o sangre en las heces. Busque asistencia médica de inmediato si presenta cualquier problema estomacal.
- **Disminución de los valores del hemograma.** BOSULIF puede causar una cifra baja de plaquetas (trombocitopenia), una cifra baja de glóbulos rojos (anemia) y una cifra baja de glóbulos blancos (neutrocitopenia). Durante el tratamiento con BOSULIF, el médico debe realizarle análisis de sangre con regularidad para controlar los valores del hemograma. Llame de inmediato al médico si, de forma repentina, tiene hemorragias o hematomas, sangre en la orina o en las heces, fiebre o cualquier indicio de infección.
- **Problemas hepáticos.** El médico debe realizarle análisis de sangre para controlar el funcionamiento del hígado regularmente durante el tratamiento con BOSULIF. Llame al médico de inmediato si nota que la piel o la parte blanca de los ojos se torna amarilla (esto se denomina “ictericia”) o si la orina es oscura (del color del té).
- **Problemas cardíacos.** BOSULIF puede causar problemas cardíacos, incluidas la insuficiencia cardíaca y la disminución del torrente sanguíneo al corazón, lo que puede provocar un infarto de miocardio. Busque asistencia médica de inmediato si experimenta dificultad para respirar, aumento de peso, dolor en el pecho o hinchazón de las manos, los tobillos o los pies.
- **Retención de líquidos.** Puede acumularse líquido en la membrana que recubre los pulmones, en el saco que rodea el corazón o en la cavidad del estómago. Busque asistencia médica de inmediato si presenta alguno de los siguientes síntomas durante el tratamiento con BOSULIF:
  - dificultad para respirar y tos;
  - dolor en el pecho;
  - hinchazón de las manos, los tobillos o los pies;
  - hinchazón en todo el cuerpo;
  - aumento de peso.

## EFECTOS SECUNDARIOS (cont.)

- **Problemas renales.** El médico debe realizar pruebas para controlar el funcionamiento de los riñones cuando inicie el tratamiento con BOSULIF y durante este. Llame al médico de inmediato si tiene alguno de los siguientes síntomas durante el tratamiento con BOSULIF:
  - orina con más o con menos frecuencia de lo habitual;
  - produce una cantidad de orina mucho mayor o mucho menor de lo habitual.

**Los efectos secundarios más frecuentes de BOSULIF en adultos con LMC incluyen** diarrea, erupción cutánea, náuseas, dolor de estómago (abdominal), vómitos, cansancio, problemas hepáticos, infecciones respiratorias (infecciones en la nariz, la garganta o los pulmones), fiebre, dolor de cabeza, estreñimiento y cambios en determinados análisis de sangre. El médico puede realizarle análisis de sangre durante el tratamiento con BOSULIF para comprobar si se produjeron cambios.

**Informe al médico o busque asistencia médica de inmediato si sufre infecciones respiratorias, pérdida de apetito, dolor de cabeza, mareos, dolor de espalda, dolor en las articulaciones, erupción cutánea o picazón mientras toma BOSULIF. Estos síntomas pueden ser indicativos de una reacción alérgica grave.**

El médico puede cambiar la dosis o interrumpir temporal o permanentemente el tratamiento con BOSULIF si usted tiene ciertos efectos secundarios.

BOSULIF puede causar problemas de fertilidad en pacientes de sexo femenino y masculino, lo que puede afectar a la capacidad para tener hijos. Hable con el médico si este tema le preocupa.

Informe al médico si presenta algún efecto secundario que le molesta o persiste. Estos no son todos los efectos secundarios que BOSULIF puede causar. Si desea obtener más información, consulte a un médico o farmacéutico. Puede notificar los efectos secundarios a la FDA. Para hacerlo, llame al 1-800-FDA-1088.

Consulte un resumen breve de **DATOS IMPORTANTES** sobre BOSULIF en las páginas 4 y 5. [HAGA CLIC AQUÍ](#) para acceder a la ficha técnica completa, en la que se incluyen las instrucciones de uso.

# TRATAMIENTO DE LA DIARREA

## Diarrea

La mayoría de los pacientes de los estudios clínicos de BOSULIF experimentaron diarrea. El 9 % de los pacientes adultos cuyo diagnóstico es reciente y el 10 % de los pacientes adultos con LMC en FC que habían recibido tratamiento previo experimentaron episodios de **diarrea grave**.

Antes de iniciar el tratamiento con BOSULIF, pregunte al equipo médico cómo prepararse para los episodios de diarrea posibles.

Si tiene diarrea, llame al equipo médico, que podría recomendarle algún medicamento para tratarla. Siempre hable con el médico antes de tomar cualquier medicamento de venta libre. El médico puede cambiar la dosis o interrumpir temporal o permanentemente el tratamiento con BOSULIF para ayudar a tratar la diarrea.

Experiencia en estudios clínicos			
	¿Qué porcentaje de pacientes en fase crónica experimentaron diarrea?	¿Cuánto hacía que había iniciado el tratamiento cuando tuvo diarrea? <sup>a</sup>	¿Cuánto duraron los episodios de diarrea? <sup>c</sup>
Pacientes adultos con diagnóstico reciente	75 %	<b>Mediana</b> de 4 días	Mediana de 3 días
Pacientes adultos que habían recibido tratamiento previo	85 %	Mediana de 2 días <sup>b</sup>	Mediana de 2 días <sup>b</sup>

<sup>a</sup>Mediana del tiempo transcurrido desde el inicio del tratamiento hasta la aparición de la diarrea.

<sup>b</sup>Incluye pacientes con enfermedad en fase avanzada.

<sup>c</sup>Mediana de la duración de cada episodio de diarrea.

## TÉRMINOS QUE DEBE CONOCER

**Mediana:** el punto medio en un conjunto de números, donde exactamente la mitad de los números están por debajo y la mitad de los números están por encima de ese punto.

**Diarrea grave:** 7 o más deposiciones al día con respecto al valor inicial.

# CONSEJOS PARA TRATAR LOS POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS

En la siguiente tabla se presenta información sobre algunos efectos secundarios frecuentes de BOSULIF y consejos que podrían servir para tratarlos. Es importante que hable sobre este contenido con el equipo médico y que hagan un plan para tratar los efectos secundarios que podría tener. Pregunte al equipo médico si hay algún medicamento de venta libre o con receta que podría ayudarlo. No todos los efectos secundarios se pueden tratar. El médico puede cambiar la dosis de BOSULIF o indicarle que deje de tomarlo.

<b>DIARREA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>Hidrátese:</b> tome mucha agua.</li> <li>✗ <b>Evite la irritación:</b> coma alimentos livianos. Evite los alimentos picantes, pesados o con mucha azúcar y la cafeína.</li> </ul>
<b>NÁUSEAS O VÓMITOS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Coma porciones más pequeñas y con más frecuencia.</li> <li>✓ Tome cantidades pequeñas de líquido.</li> <li>✗ Evite los alimentos fritos o que tengan mucha azúcar o grasa.</li> </ul>
<b>ERUPCIÓN CUTÁNEA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Use ropa suelta.</li> <li>✗ Evite bañarse durante mucho tiempo y con agua muy caliente.</li> </ul>
<b>ACIDEZ GÁSTRICA/INDIGESTIÓN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Duerma en una posición más erguida, apoyado en una almohada.</li> <li>✓ Reduzca el estrés.</li> <li>✗ Evite comer porciones grandes, y beber café y alcohol.</li> </ul>
<b>TOS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Coma bien y beba mucho líquido.</li> <li>✓ Chupe pastillas para el dolor de garganta.</li> </ul>
<b>FIEBRE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Tome medicamentos para controlar la fiebre como se lo recomiende el equipo médico.</li> </ul>
<b>CANSANCIO O DEBILIDAD</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Coma bien y beba mucho líquido.</li> <li>✓ Salga a caminar durante períodos cortos o haga ejercicio suave si se siente con fuerza.</li> <li>✓ Haga cosas relajantes, como escuchar música o leer.</li> </ul>
<b>DOLOR DE CABEZA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Aumente las actividades de cuidado personal, como dormir y meditar.</li> <li>✗ Limite el consumo de alcohol.</li> </ul>



### CONSEJO BREVE: CONTROLE CÓMO SE SIENTE EN LA APLICACIÓN MYTHERAPY®.

Controle cómo se siente para que usted y el equipo médico puedan hacer un plan para tratar los efectos secundarios que pueda tener.

Consulte un resumen breve de **DATOS IMPORTANTES** sobre BOSULIF en las páginas 4 y 5. [HAGA CLIC AQUÍ](#) para acceder a la ficha técnica completa, en la que se incluyen las instrucciones de uso.

## ¿CÓMO DEBO TOMAR BOSULIF?

Los comprimidos de BOSULIF® (bosutinib) están disponibles en las concentraciones de 400 mg, 500 mg y 100 mg, mientras que las cápsulas vienen en las concentraciones de 100 mg y 50 mg. Los comprimidos y las cápsulas se deben tomar una vez al día con alimentos.



Los comprimidos y las cápsulas que se presentan no son de tamaño real.

## DOSIS INICIAL RECOMENDADA PARA ADULTOS

ADULTOS CON DIAGNÓSTICO RECIENTE	Es posible que el médico le recete la dosis inicial de 400 mg al día
ADULTOS CON RESISTENCIA O TOLERANCIA A OTROS TRATAMIENTOS	Es posible que el médico le recete la dosis inicial de 500 mg al día

Sin embargo, la dosis puede variar de acuerdo con sus necesidades. El médico puede corregir la dosis o indicarle que deje de tomar BOSULIF si se presentan problemas o dudas sobre la tolerabilidad.

**SOLO EL MÉDICO LE PUEDE INDICAR SI CAMBIAR LA DOSIS ES ADECUADO PARA CONTROLAR EL TRATAMIENTO**

## ¿Qué es una corrección de la dosis?

Una corrección de la dosis es el cambio por parte del médico de la cantidad de BOSULIF que usted toma para adaptar mejor el tratamiento a sus necesidades. El médico puede cambiarle la dosis de BOSULIF en función de cómo le vaya con el tratamiento, ya que puede ayudarlo a controlar los efectos secundarios y la respuesta al tratamiento.

## ES IMPORTANTE QUE TOME BOSULIF EXACTAMENTE COMO SE LO HAYAN RECETADO

Siga las instrucciones que se presentan a continuación y consulte al equipo médico para obtener más información.

### QUÉ DEBE HACER



BOSULIF se toma por vía oral una vez al día



BOSULIF se debe tomar con alimentos

• Tomar BOSULIF con la misma comida del día, todos los días, podría servir para incorporarlo a su rutina



Trague los comprimidos de BOSULIF enteros



Trague las cápsulas de BOSULIF enteras



- Si se olvida de tomar una dosis de BOSULIF, tómela en cuanto se acuerde. Si se olvida de tomar una dosis por más de 12 horas, omítala y tome la siguiente a la hora habitual.
- Tome BOSULIF al menos 2 horas antes o 2 horas después de tomar un medicamento antiácido o un antihistamínico H<sub>2</sub>.

Si no puede tragar las cápsulas de BOSULIF enteras, consulte las "Instrucciones de uso" para obtener instrucciones detalladas sobre cómo preparar y administrar una dosis de las cápsulas de BOSULIF abriendo las cápsulas y mezclando el contenido con compota de manzana o yogur.

### QUÉ NO DEBE HACER



**NO cambie la dosis ni deje de tomar BOSULIF sin consultar antes con el médico.**



**NO consuma pomelo, jugo de pomelo ni suplementos que contengan extracto de pomelo.** Los productos con pomelo aumentan la cantidad de BOSULIF en su organismo.



**NO triture, rompa ni parta los comprimidos de BOSULIF.** No toque ni manipule los comprimidos triturados o rotos de BOSULIF.



**NO tome 2 dosis al mismo tiempo.** Si toma BOSULIF en exceso, llame al médico o acuda de inmediato al servicio de urgencias del hospital más cercano.



**NO tome un inhibidor de la bomba de protones (IBP) sin consultar antes con el equipo médico.**



**NO mezcle las cápsulas de BOSULIF con otros alimentos que no sean compota de manzana o yogur.** No guarde la mezcla para usarla posteriormente. Si no ingiere toda la mezcla de BOSULIF, no mezcle otra dosis.

Consulte un resumen breve de **DATOS IMPORTANTES** sobre BOSULIF en las páginas 4 y 5. [HAGA CLIC AQUÍ](#) para acceder a la ficha técnica completa, en la que se incluyen las instrucciones de uso.

## ¿CÓMO SABEMOS EL MÉDICO Y YO SI LA LMC ESTÁ RESPONDIENDO AL TRATAMIENTO?

Los controles y los análisis de sangre frecuentes son muy importantes, así que pregunte al médico sobre la posibilidad de hacerse análisis que midan el estado de la enfermedad y cómo está respondiendo al tratamiento. Se recomienda hacer un control con una reacción en cadena de la polimerasa cuantitativa (*quantitative polymerase chain reaction*, qPCR) cada 3 meses para todos los pacientes tras iniciar el tratamiento, incluidos aquellos que alcancen hitos de respuesta a los 3, 6 y 12 meses\*.

**En la LMC, la qPCR mide la cantidad del oncogén *BCR-ABL*.** La escala internacional (*International Scale*, IS) de la qPCR es la cantidad del oncogén *BCR-ABL* que tiene en la sangre en comparación con el valor inicial. Luego de que el nivel de *BCR-ABL* disminuya a  $\leq 1\%$ , se recomienda hacer un control molecular cada 3 meses durante 2 años, y cada 3 a 6 meses a partir de entonces.

Medidas de respuesta a la LMC*	
Respuesta hematológica completa	Los resultados del hemograma vuelven a los niveles normales
Respuesta citogenética completa (RCC)	Cuando no hay células con el cromosoma Filadelfia (Ph+) en la médula ósea
Respuesta molecular	Una disminución de la cantidad del oncogén <i>BCR-ABL</i>

**A continuación, se presentan los hitos de respuesta molecular de la IS de la qPCR que el equipo médico intentará alcanzar con el tratamiento:**

Hitos de la qPCR*	
	100 % con respecto al valor inicial El nivel del <i>BCR-ABL</i> antes del tratamiento
	10 % con respecto al valor inicial: reducción logarítmica de 1
	1 % con respecto al valor inicial: reducción logarítmica de 2
	0,1 % con respecto al valor inicial: reducción logarítmica de 3
	0,0032 % con respecto al valor inicial: reducción logarítmica de 4,5

**Los dos tipos de respuesta que el médico puede mencionar son la RMT y la RMM**

- La RMT es la respuesta molecular temprana, que significa que a los 3 y a los 6 meses la cantidad de *BCR-ABL* en la sangre es  $\leq 10\%$  con respecto a cuando inició el tratamiento.
- La RMM es la remisión molecular mayor, que significa que la cantidad de *BCR-ABL* es  $\leq 0,1\%$  con respecto a cuando inició el tratamiento.

## ¿QUÉ MÁS SE DEBE CONTROLAR DURANTE EL TRATAMIENTO?

**El médico puede solicitar análisis de sangre por los siguientes motivos:**

- Para controlar **las cifras en los resultados del hemograma** con regularidad durante el tratamiento con BOSULIF® (bosutinib). Llame de inmediato al médico si, de forma repentina, tiene hemorragias o hematomas, sangre en la orina o en las heces, fiebre o cualquier indicio de infección.
- Para controlar **el funcionamiento hepático** con regularidad durante el tratamiento con BOSULIF. Llame al médico de inmediato si nota que la piel o la parte blanca de los ojos se torna amarilla (esto se denomina “ictericia”) o si la orina es oscura (del color del té).

**OBTENGA MÁS INFORMACIÓN SOBRE CÓMO SE ESTUDIÓ BOSULIF EN LOS ENSAYOS CLÍNICOS EN [BOSULIF.COM](https://www.bosulif.com)**



Consulte un resumen breve de **DATOS IMPORTANTES** sobre BOSULIF en las páginas 4 y 5. **HAGA CLIC AQUÍ** para acceder a la ficha técnica completa, en la que se incluyen las instrucciones de uso.

# RECORDATORIOS PARA OBTENER EL MAYOR BENEFICIO DEL TRATAMIENTO

## Asegúrese de informar al equipo médico de cualquier cambio en los siguientes aspectos:



Los medicamentos recetados o cualquier medicamento nuevo que empiece a tomar.



Cómo se siente, incluso si piensa que no está relacionado con la LMC.



Los efectos secundarios, incluidos los que le molestan o persisten.



El estilo de vida, incluido cualquier problema médico nuevo que pueda presentar.

## Comience una rutina



Tome el medicamento a la misma hora todos los días. Considere la posibilidad de tomar BOSULIF® (bosutinib) a la mañana con el desayuno o a la noche con la cena.



**Consejo breve:** Utilice la aplicación MyTherapy® u otra aplicación de planificación o de calendario digital para establecer recordatorios diarios para tomar el medicamento.



Si le recetan cápsulas de BOSULIF, consérvelas en el frasco original.



### NO OMITA NINGUNA DOSIS, SIMPLIFIQUE LOS RECORDATORIOS PARA TOMAR EL MEDICAMENTO

Escanee el código QR para descargar la aplicación MyTherapy® y establecer recordatorios diarios

## El equipo médico lo puede ayudar con los efectos secundarios

Cuando inicie el tratamiento, considere preguntarle al médico cómo prepararse para los posibles episodios de diarrea, que es el efecto secundario más frecuente de BOSULIF.



Las correcciones de la dosis por parte del médico, el control del estilo de vida y el seguimiento a largo plazo pueden ayudarlo a controlar los efectos secundarios.

# Pfizer Oncology together™

## Ayuda económica



Lo ayudaremos a buscar opciones de ayuda económica para su receta de BOSULIF, independientemente de la cobertura del seguro.

También podemos ayudarlo a identificar recursos si tiene Medicare, otro plan de seguro del gobierno o si no tiene seguro médico.

**Ayuda de copago:** Los pacientes elegibles que tengan seguro comercial pueden pagar tan solo USD 0 al mes por BOSULIF\*. Se aplican límites, términos y condiciones. Para inscribirse, no hay requisitos de ingresos, formularios ni faxes.

\*Los pacientes no pueden utilizar esta tarjeta si están inscritos en un programa de seguros financiado con fondos estatales o federales, entre los que se incluyen, pero no de manera excluyente, Medicare, Medicaid, TRICARE, la atención médica del Departamento de Asuntos de Veteranos, un programa estatal de ayuda para medicamentos de venta con receta o el Plan de Seguro Médico del Gobierno disponible en Puerto Rico. Los pacientes pueden ahorrar hasta USD 9450 por producto al año. **La oferta se aceptará solo en farmacias participantes. Esta oferta no es un seguro médico.** No se aplican cuotas de afiliación. Pfizer se reserva el derecho a rescindir, revocar o enmendar esta oferta sin previo aviso. Si tiene alguna pregunta, llame al 1-877-744-5675, visite [PfizerOncologyTogether.com/terms](https://PfizerOncologyTogether.com/terms) o escriba a la siguiente dirección: Pfizer Oncology Together Co-Pay Savings Program, 2250 Perimeter Park Drive, Suite 300, Morrisville, NC 27560.

## Términos y condiciones de la tarjeta de copago

Al utilizar esta tarjeta de copago, usted reconoce que actualmente cumple con los criterios de elegibilidad y que cumplirá con los Términos y condiciones que se describen a continuación:

- Los pacientes no pueden utilizar esta tarjeta si están inscritos en un programa de seguros financiado con fondos estatales o federales, entre los que se incluyen, pero no de manera excluyente, Medicare, Medicaid, TRICARE, la atención médica del Departamento de Asuntos de Veteranos, un programa estatal de ayuda para medicamentos de venta con receta o el Plan de Seguro Médico del Gobierno disponible en Puerto Rico (antes conocido como "La Reforma de Salud").
- Los pacientes deben tener un seguro privado. La oferta no es válida para los pacientes que paguen en efectivo. El valor de esta tarjeta de copago está limitado a USD 9450 por uso o el valor del copago, lo que sea inferior.
- Esta tarjeta de copago no es válida cuando el costo total del medicamento recetado es elegible para el reembolso por parte del plan de seguros u otros programas de salud privada o de beneficios de farmacias.
- Debe deducir el valor de esta tarjeta de copago de cualquier solicitud de reembolso que presente al plan de seguro privado, ya sea que lo haga usted directamente o que alguien lo haga en su nombre. (continuación en la página siguiente)



### PARA APOYO PERSONALIZADO EN DIRECTO

Llame al **1-877-744-5675** (de lunes a viernes de 8 A. M. A 8 P. M., hora del este)

### VISITE

[PfizerOncologyTogether.com](https://PfizerOncologyTogether.com)

Consulte un resumen breve de **DATOS IMPORTANTES** sobre BOSULIF en las páginas 4 y 5. **HAGA CLIC AQUÍ** para acceder a la ficha técnica completa, en la que se incluyen las instrucciones de uso.

**Bosulif**<sup>®</sup>  
bosutinib  
tablets 500 mg | 400 mg | 100 mg  
capsules 100 mg | 150 mg

## Términos y condiciones de la tarjeta de copago (cont.)

- Usted es responsable de informar el uso de la tarjeta de copago a cualquier seguro privado, plan de salud u otro tercero que pague o reembolse cualquier parte de la receta surtida utilizando la tarjeta de copago, ya que puede ser un requisito. No debe utilizar la tarjeta de copago si el seguro o el plan de salud prohíbe el uso de las tarjetas de copago del fabricante.
- Esta tarjeta de copago no es válida cuando lo prohíba la ley.
- La prestación del programa de la tarjeta de copago se ofrece a los pacientes elegibles y está destinada exclusivamente a ellos, y no puede transferirse ni utilizarse en beneficio de terceros, incluidos, entre otros, terceros pagadores, gestores de prestaciones farmacéuticas o agentes de cualquiera de ellos.
- Esta tarjeta de copago no puede combinarse con ninguna otra oferta externa de ahorro, prueba gratuita ni ninguna oferta similar para la receta especificada (incluido cualquier programa ofrecido por un tercero pagador o un gestor de prestaciones farmacéuticas, o un agente de cualquiera de ellos, que ajuste las obligaciones de participación en los gastos del paciente, mediante acuerdos que pueden denominarse programas “acumuladores” o “maximizadores”).
- Los terceros pagadores, los gestores de prestaciones farmacéuticas o los agentes de cualquiera de ellos tienen prohibido ayudar a los pacientes a inscribirse en el programa de la tarjeta de copago.
- **La tarjeta de copago se aceptará solo en farmacias participantes.**
- **Si una farmacia no participa, usted podría enviar una solicitud para obtener un reembolso en relación con esta oferta.**
- **Esta tarjeta de copago no es un seguro médico.**
- La oferta es válida únicamente en los EE. UU. y Puerto Rico.
- La tarjeta de copago está limitada a 1 por persona durante este período de oferta y no es transferible.
- Una tarjeta de copago no puede canjearse más de una vez cada 30 días por paciente.
- No es necesario hacer ninguna otra compra.
- Los datos relacionados con el canje de la tarjeta de copago pueden ser recopilados, analizados y compartidos con Pfizer para hacer estudios de mercado y otros fines relacionados con la evaluación de los programas de Pfizer. Los datos compartidos con Pfizer serán acumulados y estarán desidentificados; se combinarán con datos relacionados con otros reembolsos de tarjetas de copago y no lo identificarán.
- **Pfizer se reserva el derecho a rescindir, revocar o enmendar esta oferta sin previo aviso.**
- **La oferta vence el 31/12/2024.**
- **Si una farmacia no participa, usted podría enviar una solicitud para obtener un reembolso en relación con esta oferta. Envíe por correo una copia del recibo de la farmacia del paciente en el que se indique el nombre del paciente, el nombre del medicamento comprado, el precio pagado y la fecha de la compra, junto con una copia de la tarjeta de copago de ahorro de Pfizer Oncology Together del paciente, a la siguiente dirección:**

Pfizer Oncology Together Co-Pay Savings Program  
2250 Perimeter Park Drive, Suite 300  
Morrisville, NC 27560

## ¿CUIDA DE UN PACIENTE CON LMC?

Mientras apoya a su ser querido en el proceso del tratamiento, utilice esta guía de tratamiento que los ayudará a ambos con lo siguiente:

- comprender la enfermedad y el tratamiento;
- crear una rutina para tomar BOSULIF® (bosutinib) que sea fácil de cumplir;
- prepararse para poder tratar los efectos secundarios potenciales.

## ¿Cómo puede marcar la diferencia en el tratamiento de su ser querido?

- Ofrézcale apoyo emocional.
- Recuérdele el cronograma de toma de la dosis.
- Acompáñelo a las visitas al médico y ayúdelo a tomar notas de la información importante.


## A continuación, se presentan recordatorios importantes que pueden ayudarlo:



Revise con atención los efectos secundarios para poder ayudar a su ser querido a afrontarlos.



Comuníquese con el equipo médico si tiene preguntas o preocupaciones en nombre del paciente.



Lleve un registro de las próximas citas, los días de análisis y los hitos.



Recuérdele que tome el medicamento a la misma hora todos los días.

Consulte un resumen breve de **DATOS IMPORTANTES** sobre BOSULIF en las páginas 4 y 5. [HAGA CLIC AQUÍ](#) para acceder a la ficha técnica completa, en la que se incluyen las instrucciones de uso.

# RECURSOS PARA EL PACIENTE Y EL CUIDADOR

## Cúidese mientras cuida de otros

Los pacientes necesitan mucho apoyo a lo largo del proceso, y los cuidadores, también. Hay muchos recursos disponibles para brindarles apoyo a ambos.

### PACIENTE

#### Cancer Support Community

Organización internacional sin fines de lucro que se dedica a animar y apoyar a las personas afectadas por el cáncer proporcionándoles apoyo, fomentando comunidades compasivas y derribando las barreras que dificultan la atención médica.

[www.cancersupportcommunity.org](http://www.cancersupportcommunity.org) | 1-888-793-9355

### PACIENTE Y CUIDADOR

#### Leukemia & Lymphoma Society® (LLS)

Una organización que está en la primera línea de la lucha para curar el cáncer de la sangre. La LLS se dedica a la investigación, a proporcionar acceso a los pacientes, y a la política y la defensa. La LLS tiene recursos disponibles tanto para los pacientes como para los cuidadores para ayudarlos en el tratamiento de todos los cánceres de sangre, incluso la LMC.

[www.LLS.org/caregiverworkbook](http://www.LLS.org/caregiverworkbook) | 1-800-955-4572

#### National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®)

La NCCN dispone de materiales y Guías de la NCCN para pacientes (NCCN Guidelines for Patients®).

Visite [www.nccn.org](http://www.nccn.org) para obtener más información.

\*Citado con permiso de las Guías de práctica clínica en oncología de la NCCN (NCCN Guidelines®) para la leucemia mielógena crónica V.2.2024. © National Comprehensive Cancer Network, Inc. 2024. Todos los derechos reservados. Consultado el 7 de mayo de 2024. Para consultar la versión más reciente y completa de la guía, visite NCCN.org. La NCCN no ofrece garantías de ningún tipo en relación con el contenido, el uso o la aplicación y se exime de toda responsabilidad por la aplicación o el uso en cualquier forma.

# RECURSOS PARA EL PACIENTE Y EL CUIDADOR (cont.)

### CUIDADOR

#### Caregiver Action Network

Organización sin fines de lucro que se dedica a mejorar la calidad de vida de los cuidadores familiares proporcionando educación, apoyo entre pares y recursos en todo el país.

[www.caregiveraction.org](http://www.caregiveraction.org) | 1-855-227-3640

### CUIDADOR

#### Well Spouse Association

Defiende y aborda las necesidades de las personas que cuidan a un cónyuge o a una pareja con una enfermedad crónica o una discapacidad mediante el apoyo, la educación y los recursos entre pares.

[www.wellspouse.org](http://www.wellspouse.org) | 1-732-577-8899

### Obtenga más información sobre la LMC

Los siguientes recursos están disponibles para cualquier persona que desee obtener información adicional sobre la LMC:

<b>Sociedad Americana Contra el Cáncer</b> <b>1-800-227-2345</b> <a href="http://www.cancer.org">www.cancer.org</a>	<b>The National CML Society</b>  <a href="http://www.nationalcmlsociety.org">www.nationalcmlsociety.org</a>	<b>CancerCare</b>  <b>1-800-813-4673</b> <a href="http://www.cancercares.org">www.cancercares.org</a>
---	---	--

Consulte un resumen breve de **DATOS IMPORTANTES** sobre **BOSULIF** en las páginas 4 y 5. [HAGA CLIC AQUÍ](#) para acceder a la ficha técnica completa, en la que se incluyen las instrucciones de uso.

## DATOS IMPORTANTES

### ¿Qué es BOSULIF® (bosutinib)?

BOSULIF es un medicamento de venta con receta que se usa para tratar a adultos que tienen un tipo determinado de leucemia llamada leucemia mielógena crónica con cromosoma Filadelfia (LMC Ph+) cuyo diagnóstico es reciente, o que ya no se beneficien de tratamientos previos o que no los hayan tolerado.

No tome BOSULIF si es alérgico al bosutinib o a cualquiera de los componentes de BOSULIF.

#### Antes de tomar BOSULIF, informe al médico si:

- tiene afecciones hepáticas;
- tiene afecciones cardíacas;
- tiene afecciones renales;
- tiene hipertensión arterial;
- tiene diabetes;
- está embarazada o tiene intención de quedar embarazada. BOSULIF puede dañar al feto. Informe de inmediato al médico si queda embarazada mientras toma BOSULIF.
  - Las **mujeres** que puedan quedar embarazadas deben realizarse una prueba de embarazo antes de iniciar el tratamiento con BOSULIF y deben utilizar un método anticonceptivo eficaz durante el tratamiento con BOSULIF y durante al menos 2 semanas después de la última dosis. Hable con el médico sobre los métodos anticonceptivos más adecuados para usted.
- está amamantando o tiene intención de hacerlo. Se desconoce si BOSULIF pasa a la leche materna o si puede hacerle daño al bebé. No dé el pecho durante el tratamiento con BOSULIF ni durante al menos 2 semanas después de la última dosis.

**Informe al médico sobre los medicamentos que toma,** incluidos los medicamentos de venta con receta, los medicamentos de venta libre, las vitaminas y los suplementos herbarios. BOSULIF y determinados medicamentos pueden interactuar.

Estos datos importantes para el consumidor se basan en la información para el paciente de BOSULIF LAB-0443-16, octubre de 2023.

### ¿Cuáles son los efectos secundarios posibles de BOSULIF?

**BOSULIF puede causar efectos secundarios graves, por ejemplo:**

- **Problemas estomacales.** BOSULIF puede causar dolor de estómago (abdomen), náuseas, diarrea, vómitos o sangre en las heces. Busque asistencia médica de inmediato si presenta cualquier problema estomacal.
- **Disminución de los valores del hemograma.** BOSULIF puede causar una cifra baja de plaquetas (trombocitopenia), una cifra baja de glóbulos rojos (anemia) y una cifra baja de glóbulos blancos (neutrocitopenia). Durante el tratamiento con BOSULIF, el médico debe realizarle análisis de sangre con regularidad para controlar los valores del hemograma. Llame de inmediato al médico si, de forma repentina, tiene hemorragias o hematomas, sangre en la orina o en las heces, fiebre o cualquier indicio de infección.
- **Problemas hepáticos.** El médico debe realizarle análisis de sangre para controlar el funcionamiento del hígado regularmente durante el tratamiento con BOSULIF. Llame al médico de inmediato si nota que la piel o la parte blanca de los ojos se torna amarilla (esto se denomina “ictericia”) o si la orina es oscura (del color del té).
- **Problemas cardíacos.** BOSULIF puede causar problemas cardíacos, incluidas la insuficiencia cardíaca y la disminución del torrente sanguíneo al corazón, lo que puede provocar un infarto de miocardio. Busque asistencia médica de inmediato si experimenta dificultad para respirar, aumento de peso, dolor en el pecho o hinchazón de las manos, los tobillos o los pies.
- **Retención de líquidos.** Puede acumularse líquido en la membrana que recubre los pulmones, en el saco que rodea el corazón o en la cavidad del estómago. Busque asistencia médica de inmediato si presenta alguno de los siguientes síntomas durante el tratamiento con BOSULIF:
  - dificultad para respirar y tos;
  - hinchazón en todo el cuerpo;
  - dolor en el pecho;
  - aumento de peso.
  - hinchazón de las manos, los tobillos y los pies;
- **Problemas renales.** El médico debe realizar pruebas para controlar el funcionamiento de los riñones cuando inicie el tratamiento con BOSULIF y durante este. Llame al médico de inmediato si tiene alguno de los siguientes síntomas durante el tratamiento con BOSULIF:
  - orina con más o con menos frecuencia de lo habitual;
  - produce una cantidad de orina mucho mayor o mucho menor de lo habitual.

**Los efectos secundarios más frecuentes de BOSULIF en adultos con LMC incluyen** diarrea, erupción cutánea, náuseas, dolor de estómago (abdominal), vómitos, cansancio, problemas hepáticos, infecciones respiratorias (infecciones en la nariz, la garganta o los pulmones), fiebre, dolor de cabeza, estreñimiento y cambios en determinados análisis de sangre. El médico puede realizarle análisis de sangre durante el tratamiento con BOSULIF para comprobar si se produjeron cambios.

**Informe al médico o busque asistencia médica de inmediato si sufre infecciones respiratorias, pérdida de apetito, dolor de cabeza, mareos, dolor de espalda, dolor en las articulaciones, erupción cutánea o picazón mientras toma BOSULIF. Estos pueden ser síntomas de una reacción alérgica grave.**

El médico puede cambiar la dosis o interrumpir temporal o permanentemente el tratamiento con BOSULIF si usted tiene ciertos efectos secundarios.

BOSULIF puede causar problemas de fertilidad en pacientes de sexo femenino y masculino, lo que puede afectar a la capacidad para tener hijos. Hable con el médico si este tema le preocupa.

Informe al médico si presenta algún efecto secundario que le molesta o persiste. Estos no son todos los efectos secundarios que BOSULIF puede causar. Si desea obtener más información, consulte a un médico o farmacéutico. Puede informar los efectos secundarios a la FDA; para hacerlo, llame al 1-800-FDA-1088.

# RECORDATORIOS PARA OBTENER EL MAYOR BENEFICIO DEL TRATAMIENTO

## Asegúrese de informar al equipo médico de cualquier cambio en los siguientes aspectos:



Los medicamentos recetados o cualquier medicamento nuevo que empiece a tomar.



Cómo se siente, incluso si piensa que no está relacionado con la LMC.



Los efectos secundarios, incluidos los que le molestan o persisten.



El estilo de vida, incluido cualquier problema médico nuevo que pueda presentar.

## Comience una rutina



Tome el medicamento a la misma hora todos los días. Considere la posibilidad de tomar BOSULIF® (bosutinib) a la mañana con el desayuno o a la noche con la cena.



**Consejo breve:** Utilice la aplicación MyTherapy® u otra aplicación de planificación o de calendario digital para establecer recordatorios diarios para tomar el medicamento.



Si le recetan cápsulas de BOSULIF, consérvelas en el frasco original.



**NO OMITA NINGUNA DOSIS SIMPLIFIQUE LOS RECORDATORIOS PARA TOMAR EL MEDICAMENTO**  
Escanee el código QR para descargar la aplicación MyTherapy® y establecer recordatorios diarios

## El equipo médico lo puede ayudar con los efectos secundarios

Cuando inicie el tratamiento, considere preguntarle al médico cómo prepararse para los episodios posibles de diarrea, que es el efecto secundario más frecuente de BOSULIF.



Las correcciones de la dosis por parte del médico, el control del estilo de vida y el seguimiento a largo plazo pueden ayudarlo a controlar los efectos secundarios.

Nombre del médico: \_\_\_\_\_

Número de teléfono del médico: \_\_\_\_\_

## Consejos para tratar los efectos secundarios

La siguiente tabla presenta información sobre algunos efectos secundarios frecuentes de BOSULIF y consejos que podrían servir para tratarlos. Es importante que hable sobre este contenido con el equipo médico y que hagan un plan para tratar los efectos secundarios que podría tener. Consulte al equipo médico si hay algún medicamento de venta libre o con receta que podría ayudarlo. No todos los efectos secundarios se pueden tratar. El médico puede cambiar la dosis de BOSULIF o indicarle que deje de tomarlo.

<b>DIARREA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>Hidrátese:</b> tome mucha agua.</li> <li>✗ <b>Evite la irritación:</b> coma alimentos livianos. Evite los alimentos picantes, pesados o con mucha azúcar y la cafeína.</li> </ul>
<b>NÁUSEAS O VÓMITOS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Coma porciones más pequeñas y con más frecuencia.</li> <li>✓ Tome cantidades pequeñas de líquido.</li> <li>✗ Evite los alimentos fritos o que tengan mucha azúcar o grasa.</li> </ul>
<b>ERUPCIÓN CUTÁNEA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Use ropa suelta.</li> <li>✗ Evite bañarse durante mucho tiempo y con agua muy caliente.</li> </ul>
<b>ACIDEZ GÁSTRICA/ INDIGESTIÓN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Duerma en una posición más erguida, apoyado en una almohada.</li> <li>✓ Reduzca el estrés.</li> <li>✗ Evite comer porciones grandes, y beber café y alcohol.</li> </ul>
<b>TOS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Coma bien y beba mucho líquido.</li> <li>✓ Chupe pastillas para el dolor de garganta.</li> </ul>
<b>FIEBRE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Tome medicamentos para controlar la fiebre como se lo recomiende el equipo médico.</li> </ul>
<b>CANSANCIO O DEBILIDAD</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Coma bien y beba mucho líquido.</li> <li>✓ Salga a caminar durante períodos cortos o haga ejercicio suave si se siente con fuerza.</li> <li>✓ Haga cosas relajantes, como escuchar música o leer.</li> </ul>
<b>DOLOR DE CABEZA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Aumente las actividades de cuidado personal como dormir y meditar.</li> <li>✗ Limite el consumo de alcohol.</li> </ul>

Consulte un resumen breve de **DATOS IMPORTANTES** sobre BOSULIF en las páginas 4 y 5. **HAGA CLIC AQUÍ** para acceder a la **ficha técnica completa**, en la que se incluyen las instrucciones de uso.

 **Bosulif**<sup>®</sup>  
bosutinib  
tablets 500 mg | 400 mg | 100 mg  
capsules 100 mg | 150 mg

## DATOS IMPORTANTES

### ¿Qué es BOSULIF® (bosutinib)?

BOSULIF es un medicamento de venta con receta que se usa para tratar a adultos que tienen un tipo determinado de leucemia llamada leucemia mielógena crónica con cromosoma Filadelfia (LMC Ph+) cuyo diagnóstico es reciente, o que ya no se beneficien de tratamientos previos o que no los hayan tolerado.

No tome BOSULIF si es alérgico al bosutinib o a cualquiera de los componentes de BOSULIF.

### Antes de tomar BOSULIF, informe al médico si:

- tiene afecciones hepáticas;
- tiene afecciones cardíacas;
- tiene afecciones renales;
- tiene hipertensión arterial;
- tiene diabetes;
- está embarazada o tiene intención de quedar embarazada. BOSULIF puede dañar al feto. Informe de inmediato al médico si queda embarazada mientras toma BOSULIF.
  - Las **mujeres** que puedan quedar embarazadas deben realizarse una prueba de embarazo antes de iniciar el tratamiento con BOSULIF y deben utilizar un método anticonceptivo eficaz durante el tratamiento con BOSULIF y durante al menos 2 semanas después de la última dosis. Hable con el médico sobre los métodos anticonceptivos más adecuados para usted.
- está amamantando o tiene intención de hacerlo. Se desconoce si BOSULIF pasa a la leche materna o si puede hacerle daño al bebé. No dé el pecho durante el tratamiento con BOSULIF ni durante al menos 2 semanas después de la última dosis

**Informe al médico sobre los medicamentos que toma**, incluidos los medicamentos de venta con receta, los medicamentos de venta libre, las vitaminas y los suplementos herbarios. BOSULIF y determinados medicamentos pueden interactuar.

Estos datos importantes para el consumidor se basan en la información para el paciente de BOSULIF LAB-0443-16, octubre de 2023.

### ¿Cuáles son los efectos secundarios posibles de BOSULIF?

**BOSULIF puede causar efectos secundarios graves, por ejemplo:**

- **Problemas estomacales.** BOSULIF puede causar dolor de estómago (abdomen), náuseas, diarrea, vómitos o sangre en las heces. Busque asistencia médica de inmediato si presenta cualquier problema estomacal.
- **Disminución de los valores del hemograma.** BOSULIF puede causar una cifra baja de plaquetas (trombocitopenia), una cifra baja de glóbulos rojos (anemia) y una cifra baja de glóbulos blancos (neutrocitopenia). Durante el tratamiento con BOSULIF, el médico debe realizarle análisis de sangre con regularidad para controlar los valores del hemograma. Llame de inmediato al médico si, de forma repentina, tiene hemorragias o hematomas, sangre en la orina o en las heces, fiebre o cualquier indicio de infección.
- **Problemas hepáticos.** El médico debe realizarle análisis de sangre para controlar el funcionamiento del hígado regularmente durante el tratamiento con BOSULIF. Llame al médico de inmediato si nota que la piel o la parte blanca de los ojos se torna amarilla (esto se denomina “ictericia”) o si la orina es oscura (del color del té).
- **Problemas cardíacos.** BOSULIF puede causar problemas cardíacos, incluidas la insuficiencia cardíaca y la disminución del torrente sanguíneo al corazón, lo que puede provocar un infarto de miocardio. Busque asistencia médica de inmediato si experimenta dificultad para respirar, aumento de peso, dolor en el pecho o hinchazón de las manos, los tobillos o los pies.
- **Retención de líquidos.** Puede acumularse líquido en la membrana que recubre los pulmones, en el saco que rodea el corazón o en la cavidad del estómago. Busque asistencia médica de inmediato si presenta alguno de los siguientes síntomas durante el tratamiento con BOSULIF:
  - dificultad para respirar y tos;
  - hinchazón de las manos, los tobillos y los pies;
  - aumento de peso.
  - dolor en el pecho;
  - hinchazón en todo el cuerpo;
- **Problemas renales.** El médico debe realizar pruebas para controlar el funcionamiento de los riñones cuando inicie el tratamiento con BOSULIF y durante este. Llame al médico de inmediato si tiene alguno de los siguientes síntomas durante el tratamiento con BOSULIF:
  - orina con más o con menos frecuencia de lo habitual;
  - produce una cantidad de orina mucho mayor o mucho menor de lo habitual.

**Los efectos secundarios más frecuentes de BOSULIF en adultos con LMC incluyen** diarrea, erupción cutánea, náuseas, dolor de estómago (abdominal), vómitos, cansancio, problemas hepáticos, infecciones respiratorias (infecciones en la nariz, la garganta o los pulmones), fiebre, dolor de cabeza, estreñimiento y cambios en determinados análisis de sangre. El médico puede realizarle análisis de sangre durante el tratamiento con BOSULIF para comprobar si se produjeron cambios.

**Informe al médico o busque asistencia médica de inmediato si sufre infecciones respiratorias, pérdida de apetito, dolor de cabeza, mareos, dolor de espalda, dolor en las articulaciones, erupción cutánea o picazón mientras toma BOSULIF. Estos pueden ser síntomas de una reacción alérgica grave.**

El médico puede cambiar la dosis o interrumpir temporal o permanentemente el tratamiento con BOSULIF si usted tiene ciertos efectos secundarios.

BOSULIF puede causar problemas de fertilidad en pacientes de sexo femenino y masculino, lo que puede afectar a la capacidad para tener hijos. Hable con el médico si este tema le preocupa.

Informe al médico si presenta algún efecto secundario que le molesta o persiste. Estos no son todos los efectos secundarios que BOSULIF puede causar. Si desea obtener más información, consulte a un médico o farmacéutico. Puede informar los efectos secundarios a la FDA; para hacerlo, llame al 1-800-FDA-1088.

 **Bosulif**<sup>®</sup>  
bosutinib  
tablets 500 mg | 400 mg | 100 mg  
capsules 100 mg | 50 mg